

Особенности проведения дератизации в образовательной организации

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий. СП 3.5.3.3223-14 ", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 сентября 2014 г. № 58, образовательные организации относятся к объектам, имеющим особое эпидемиологическое значение. Соответственно в них должны проводиться систематические или экстренные дератизационные мероприятия.

В отличие от других объектов, имеющих эпидемиологическое значение, организация дератизации в местах постоянного и большого скопления детей имеет ряд особенностей. Дератизационные мероприятия проводятся в плановом режиме в местах, недоступных детям: в подвалах, помещениях для хранения продуктов и инвентаря, пищеблоках, подсобных помещениях на прилегающей территории. Дератизация проводится обученным персоналом организаций дезинфекционного профиля.

Обследование объектов и прилегающей к ним территории направлено на обнаружение грызунов, определение их видовой принадлежности, численности, особенностей размещения, путей передвижения с целью выбора оптимальной тактики снижения численности грызунов, а также на оценку санитарно-гигиенического и инженерно-технического состояния объекта.

При обследовании объектов применяются субъективная оценка и объективные методы обнаружения грызунов:

- субъективная оценка включает в себя выявление следов жизнедеятельности грызунов — свежие норы, помет или погрызы, наличие жалоб на грызунов, характер и масштабы причиняемого ими вреда, определение периодичности и ритма появления грызунов на объекте;
- объективное обнаружение грызунов на объекте проводится контрольно-пылевыми (следовыми) площадками, ловушками, капканами, неотравленными приманками, тампонированием, заклеиванием нор и другими методами.

Внимание! Объект и территория считаются заселенной грызунами при наличии хотя бы одного из следующих признаков:

- наличие отловленного грызуна;
- обнаружение следов грызунов на контрольно-пылевых (следовых) площадках;
- открытое перемещение грызунов по объекту или территории;
- наличие жилых нор, свежего помета, повреждение продуктов, тары и других предметов;
- поедание грызунами разложенной приманки.

В образовательных организациях должны соблюдаться особые меры предосторожности с размещением приманок только в стационарных приманочных станциях (емкости из пластмассы, картона, дерева или других материалов), использовать препаративные родентицидные формы, исключая разнос их грызунами и попадание на продукты питания, медикаменты и предметы быта.

Внимание! В образовательных организациях запрещается раскладывать приманку в помещениях, где находятся дети (в туалетах, умывальных комнатах, спальнях, игровых и учебных помещениях, на территории игровых площадок). Также запрещается применять

приманки, содержащие родентициды острого действия, и проводить опыливание ими входов нор грызунов.

Показанием к организации и проведению истребительных дератизационных мероприятий на освобожденных ранее от грызунов объектах и прилегающих к ним территориях служит обнаружение грызунов, либо наличие свежих следов их жизнедеятельности (жилые норы, погрызы и порча продуктов, свежий помет).

Истребительные мероприятия осуществляются с применением зерновых, гранулированных приманок, парафинированных и сухих брикетов, бумажных, желатиновых и капсулированных контейнеров, галет, мягких брикетов (тесто- или жиросодержащими). Также используются физические средства — клеевые ловушки, давилки, отпугивающие устройства типа ОЗДС.

Внимание! Дератизацию проводят одновременно во всех помещениях, заселенных грызунами, и на прилегающей территории.